

## KULLANMA TALİMATI

### EFEXOR® XR 75 mg Mikropellet Kapsül

#### Ağızdan alınır

**Etkin madde:** Her mikropellet kapsül uzatılmış salım formülasyonunda hidroklorür tuzu halinde 75 mg venlafaksin içerir.

**Yardımcı maddeler:** Mikrokristal selüloz, hidroksipropilmetil selüloz 2208 3 cps, hidroksipropilmetil selüloz 2910 6 cps, etil selüloz 50 cps, talk, kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), titanyum dioksit (E 171), jelatin, ink.

***Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.***

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. EFEXOR XR nedir ve ne için kullanılır ?***
- 2. EFEXOR XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. EFEXOR XR nasıl kullanılır ?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. EFEXOR XR'ın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. EFEXOR XR nedir ve ne için kullanılır?

- Uzatılmış salımlı mikropellet kapsül formundadır. Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler) olarak isimlendirilen ilaç grubuna ait bir antidepresandır.
- Kutuda 14 ve 28 mikropellet kapsül içeren blister ambalajlardadır.
- Her tür depresyon tedavisinde, depresyonun nüksünün ve yeni episodların (atakların) engellenmesinde, depresyona eşlik eden anksiyete (kaygı) tedavisinde, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde, sosyal fobi tedavisinde, agorafobi (fobik durumlar) ile birlikte veya agorafobi (fobik durumlar) olmaksızın görülen panik bozukluğu tedavisinde kullanılır.

## 2. EFEXOR XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Majör Depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve gençlerde yapılan kısa dönemli klinik çalışmalarda antidepresanlar intihar düşünce ve davranışlarının (intihara yatkınlık) riskini arttırmıştır. Çocuk veya gençte Eflexor veya herhangi diğer bir antidepresan kullanılması düşünüldüğünde, tanımlanan risk ile klinik ihtiyaç dengelenmelidir. İntihar ile ilgili uyarıya bakınız.

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Eflexor XR pediyatrik hastalarda (18 yaş altı) kullanım için onaylı değildir.

### **EFEXOR XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer venlafaksine veya formülasyondaki maddelerin herhangi birine alerjiniz varsa.
- Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte. MAOI tedavisinin kesilmesinden sonra en az 14 gün geçmeden venlafaksin tedavisine başlamamalısınız. Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün önce venlafaksin kullanımına son vermelisiniz.

## EFEXOR XR'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer,

- Bařka bir ila EFEXOR XR ile eř zamanlı olarak kullanılırsa, serotonin sendromu riski geliřimini artırabilir (“Diđer ilalar ile birlikte kullanımı” blmne bkz).
- Bazı glokom (gz ierisindeki basın artıřı) eřitleri gibi gz probleminiz varsa.
- Yksek kan basıncı gemiřiniz varsa.
- Bir kalp problemi gemiřiniz varsa.  
Tanısı konmuř veya řpheli konjenital uzamıř QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani lmlere yol aabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yařamı tehdit eden dzensiz kalp ritmi) hastalarında kullanımından kaınılmalıdır.
- Bir nbet (konvlsiyon) gemiřiniz varsa.
- Vcoda su kaybettiren “diretik” olarak bilinen ilalardan kullanıyorsanız veya herhangi bir nedenden dolayı vcudunuz su kaybettiyse.
- Cildinizde kolay morluk oluřuyorsa veya kolaylıkla kanamaya eđiliminiz varsa (kanama bozuklukları gemiři) veya kanama riskini artıran bařka bir ilacı kullanıyorsanız.
- Kolesterol seviyeniz yksekse.
- Eđer iki ulu duygu durum bozukluđu (bipolar bozukluk) gemiřiniz varsa veya ailenizde bir kiřide bipolar bozukluk gemiři varsa.
- Agresif davranıř gemiřiniz varsa.
- Madde ktye kullanımı ve bađımlılık gemiřiniz varsa.
- Zayıflatıcı bir ila kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

İntihar dřncesi ve depresyon veya anksiyete bozukluklarınızın ktleřmesi durumu

řayet ruhsal knt yařıyorsanız (deprese iseniz) veya belirli bazı psikiyatrik bozukluklarınız varsa zaman zaman kendinizi ldrme dřncesine sahip

olabilirsiniz. Bu düşünceler siz antidepresanları kullanmaya ilk başladığınızda veya toplam doz veya dozaj sıklığında herhangi bir değişiklik olması durumunda artabilir. Klinik denemelerden elde edilen bilgiler antidepresan ilaçların majör depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklara sahip çocuklar, adolesanlar ve genç yetişkinlerde (18-24 yaşlar) intihar eğilimi riskini artırdığını göstermiştir.

Şayet herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceniz olmuşsa, derhal doktorunuzla iletişim kurunuz veya bir hastaneye gidiniz.

Depresyonda olduğunuzu veya bir anksiyete bozukluğunuzun olduğunu bir akrabanıza yada yakın bir arkadaşınıza söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz size yardımcı olacaktır. Depresyon veya anksiyetenizin gittikçe kötüleştiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarındaki herhangi bir değişiklikten endişe duyuyorlarsa bunu size bildirmelerini söyleyiniz.

#### Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda kullanımı

EFEXOR XR, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmaz. Ayrıca, 18 yaşının altındaki hastaların bu sınıf ilaçları kullandıkları zaman düşmanlık (hostilite), intihar düşünceleri ve kendine zarar verme gibi yan etkilerde artış olduğunu bilmeniz gerekir.

#### **EFEXOR XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

EFEXOR XR'ı yiyeceklerle almanız gerekir ("EFEXOR XR nasıl kullanılır" isimli 3. bölüme bkz).

EFEXOR XR kullandığınız sürece alkol almaktan kaçınmanız gerekir.

#### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız durumu doktorunuza söyleyiniz. EFEXOR XR'ı sadece doktorunuz ile birlikte potansiyel faydalarının riskinden fazla olduğunu düşünürseniz kullanmanız gerekir.

Eğer gebelik süresince EFEXOR XR kullanırsanız, bebeğiniz doğduğu zaman bazı belirtilere sahip olabileceğinden bunu doktorunuzun veya ebenizin bilmesine izin veriniz. Bu semptomlar genellikle bebek doğduktan hemen sonra meydana gelmektedir. Belirtiler uygun şekilde beslenememe ve nefes alma güçlüğü

içermektedir. Şayet bebeğiniz doğduğu zaman bu semptomları varsa veya siz olabileceğinden endişe ediyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuz ve/veya ebenizle iletişime geçiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

EFEXOR XR süte geçmektedir. Bebek üzerinde bir etki oluşturması riski bulunmaktadır. Bu yüzden doktorunuzla bu konuyu görüşün, doktorunuz emzirmeyi mi kesmeniz gerektiğine yoksa EFEXOR XR kullanımını mı bırakmanız gerektiğine karar verecektir.

### **Araç ve makine kullanımı**

EFEXOR XR'in sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araba ve herhangi bir makine kullanmayınız.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) olarak bilinen bir ilaç kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız EFEXOR XR kullanmayınız.
- Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan (“Olası yan etkiler” bölümüne bkz) “serotonin sendromu” venlafaksinle tedavi görüldüğü sürece özellikle de diğer ilaçlarla birlikte alındığı zaman meydana gelebilir. Bu ilaçlara aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:
  - Triptanlar (migren için kullanılan)
  - SNRİ, SSRİ'ler veya lityum içeren diğer ilaçlar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
  - Bir antibiyotik olan linezolid gibi MAOI olarak bilinen ilaçlar (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan)
  - Sibutramin içeren ilaçlar (kilo kaybı için kullanılan)
  - Tramadol içeren ilaçlar (ağrı kesici)

- St. John's Wort içeren ürünler (aynı zamanda Hypericum perforatum olarak ta isimlendirilen hafif dereceli depresyon tedavisinde kullanılan doğal yada bitkisel bir ilaç)
- Triptofan içeren ürünler (uyku yada depresyon gibi problemler için kullanılan)

Serotonin sendromunun belirtileri ve bulguları aşağıdakilerin bir karışımını içerebilir:

Huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyonlar), koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, artmış vücut ısısı, kan basıncındaki hızlı değişiklikler, reflekslerin aşırı aktif olması, ishal, koma, mide bulantısı, kusma. Eğer sizde serotonin sendromunun meydana geldiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi destek alınız.

Ayrıca aşağıdaki ilaçlar da EFEXOR XR ile etkileşime girebilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Şayet siz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bundan söz etmeniz özellikle önemlidir:

- Ketokonazol (bir antifungal ilaç)
- Haloperidol (prisikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için)
- Metoprolol (yüksek kan basıncı ve kalp problemlerini tedavi eden bir beta bloker)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. EFEXOR XR nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Sosyal Fobisi olan hastalar hariç (aşağıya bakınız), günlük 75 mg doza cevap vermeyen hastalarda doz günlük 225 mg'a kadar yükseltilebilir. Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 günden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

EFEXOR tablet ile tedavi edilmekte olan depresyon hastaları en yakın eşdeğer doz (mg/gün) ile EFEXOR XR'a geçebilirler. Örneğin, günde iki kez 37.5 mg EFEXOR tablettten, günde 1 kez 75 mg EFEXOR XR kaspüle geçilebilir. Ancak kişisel doz ayarlaması gerekli olabilir.

Majör depresyonda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg EFEXOR XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler. Orta şiddette depresyonu olan hastalar için tavsiye edilen doz günde 225 mg EFEXOR XR iken, bir çalışmada daha şiddetli depresyonu olan hastalar günde ortalama 350 mg doza cevap vermişlerdir (günlük doz aralığı 150 mg - 375 mg). Yaygın anksiyete bozukluğunda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg EFEXOR XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobide tavsiye edilen doz günlük 75 mg EFEXOR XR'dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Panik bozukluğunda tavsiye edilen doz 7 gün, günde 1 kez 37.5 mg EFEXOR'dur. Daha sonra doz günde 75 mg'a yükseltilmelidir. Günde 75 mg'lık doza cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

EFEXOR XR'ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarak sıvıyla yutulmalıdır. Kapsül bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya suya karıştırılmamalıdır. EFEXOR XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.

- **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:**

- 18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur

- **Yaşlılarda kullanımı:**

- Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

- **Özel kullanım durumları:**

- **Böbrek ve karaciğer yetmezliği:**

- Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir. Eğer karaciğer veya böbrek probleminiz varsa doktorunuza söyleyiniz. Zira EFEXOR XR dozunuzun azaltılması gerekebilir.

*Eğer EFEXOR XR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla EFEXOR XR kullandıysanız:**

Olası bir doz aşımının belirtileri hızlı kalp atımı, uyanıklık seviyesinde değişiklik (uykulu halden komaya değişen aralıkta), bulanık görme, nöbetler veya krizler ve kusmayı içerebilir.

Geriye dönük yayımlanmış çalışmalar, venlafaksin “seçici serotonin geri alım inhibitörü” (SSRI) grubundaki antidepresanlara göre daha fazla, “trisiklik” grubu antidepresanlara göre daha az oranda aşırı doza bağlı ölüme yol açtığına işaret etmektedir. Hastalık sıklığı, dağılımı ve nedenlerini ortaya koyan çalışmalar, venlafaksinle tedavi edilen hastaların SSRI grubu antidepresanlarla tedavi edilenlere oranla intihar risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşırı doza bağlı ölümlerin ne kadarının venlafaksin toksisitesine, ne kadarının venlafaksin alan hastaların diğer özelliklerine bağlı olduğu açık değildir.

*EFEXOR XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**Efexor XR kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**Efexor XR kullanmayı bırakırsanız:**

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuzun tavsiyesi olmaksızın tedavinizi bırakmayınız veya dozu azaltmayınız. Şayet doktorunuz artık EFEXOR XR kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsa, size tamamıyla tedaviyi kesmeden önce dozunuzu yavaşça azaltmanızı söyleyebilir. İnsanlarda EFEXOR XR kullanımı bırakıldıktan sonra, özellikle de EFEXOR XR kullanımı aniden kesildiği zaman veya doz çok hızlı azaltıldığı zaman yan etkilerin meydana geleceği bilinmelidir. Bazı hastalarda dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı (hipomani), kaygı, aşırı huzursuzluk ve gerilim içinde bulunma, sinirlilik, zihin karışıklığı, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları, yorgunluk, uyuşukluk, uyuşma, baş dönmesi, nöbet, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, kulak çınlaması, bozulmuş koordinasyon ve denge, titreme, terleme, ağız kuruluğu, iştahsızlık, ishal,

mide bulantısı, ve kusma gibi semptomları görülebilir. Doktorunuz EFEXOR XR tedavisini aşamalı olarak nasıl bırakacağınızı size tavsiye edecektir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi EFEXOR XR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın ( $\geq 1/10$ ); yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ); yaygın olmayan ( $\geq 1/1.000$  ila  $< 1/100$ ); seyrek ( $\geq 1/10.000$  ila  $< 1/1.000$ ); çok seyrek ( $< 1/10.000$ ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

#### **Kan ve lenf sistemi hastalıkları**

Yaygın olmayan:	Deride morarma (ekimoz) , vücut boşuklarını kaplayan zar (mukoza) kanaması, mide ve barsak kanaması (gastrointestinal kanama)
Seyrek:	Uzamış kanama zamanı, trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)
Çok seyrek:	Kan diskrazisi [beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz), kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) ve kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni) dahil]

#### **Metabolizma ve beslenme hastalıkları**

Yaygın:	Serum kolesterol seviyesinin yükselmesi (özellikle uzun süre kullanım ve muhtemelen yüksek dozlar ile), kilo kaybı
Yaygın olmayan:	Anormal karaciğer fonksiyon testleri, kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi), kilo alma
Seyrek:	Karaciğer iltihabı (hepatit), uygunsuz antidiüretik hormon salgılaması sendromu (SIADH)
Çok seyrek:	Süt salgılatıcı hormon (prolaktin) seviyelerinin yükselmesi

## **Sinir sistemi hastalıkları**

Çok yaygın:	Baş ağrısı
Yaygın:	Anormal rüya görme, cinsel iştah (libido) azalması, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kas tonüsünün artması, uykusuzluk, sinirlilik, uyuşma (parestezi), sakinleşme (sedasyon), titreme (tremor), kafa karışıklığı, kendine yabancılaşma
Yaygın olmayan:	Uyuşukluk, hayal görme (halüsinasyonlar), bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmaları (miyoklonus), huzursuzluk (ajitasyon), bozulmuş koordinasyon ve denge
Seyrek:	Yerinde duramama hali (akatizi)/psikomotor huzursuzluk, nöbet (konvülsiyon), aşırı hareketlilik (manik reaksiyon), bilinç düzeyindeki değişim ve kaslarda sertleşme ile ortaya çıkan durum (nöroleptik malignant sendromu (NMS)), aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu (serotonerjik sendrom)
Çok seyrek:	Huzursuzluk - taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum), ekstrapiramidal reaksiyonlar (kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu (distoni) ve istemli hareketlerde bozukluk (diskinezi) dahil), tardif diskinezi

## **Kardiyak hastalıklar**

Yaygın:	Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), vazodilatasyon (çoğunlukla sıcak basması), çarpıntı (palpitasyon)
Yaygın olmayan:	Kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon), oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (postural hipotansiyon), bayılma (senkop), kalp hızlanması (taşikardi)

Çok seyrek: QT uzaması, kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler fibrilasyon), ventriküler taşikardi (torsade de pointes dahil)

### **Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar**

Yaygın: Esneme

Çok seyrek: Pulmoner eozinofili

### **Gastrointestinal hastalıklar**

Yaygın: İştah azalması, kabızlık (konstipasyon), mide bulantısı, kusma

Yaygın olmayan: Diş gıcırdaması, ishal (diyare)

Çok seyrek: Pankreas iltihabı (pankreatit)

### **Deri ve deri altı doku hastalıkları**

Yaygın: Terleme (gece terlemeleri dahil)

Yaygın olmayan: Kızarıklık, saç dökülmesi (alopesi)

Çok seyrek: ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme ve stevens-johnson sendromu), kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bilinmiyor: Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

### **Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları**

Çok seyrek: İskelet kası yıkımı (rabdomiyoliz)

### **Böbrek, idrar ve genital hastalıklar**

Yaygın: Anormal boşalma (anormal ejakülasyon)/orgazm (erkeklerde), orgazm olamama (anorgasmia), sertleşme güçlüğü (ereksiyon disfonksiyonu), idrar yapma bozukluğu (çoğunlukla duraksayarak), artmış kanama ve artmış düzensiz kanamayla ilgili adet bozuklukları (menstural bozukluklar) (örn, miktar ve süre olarak adet

Yaygın olmayan:	kanamasının fazla olması (menoraji), adet dışı görülen kanama (metroraji), idrara çıkma sıklığında artış Anormal orgazm (kadınlarda), idrar yapamama (idrara retansiyonu)
Seyrek:	İdrarı tutamama (idrara inkontinansı)

### **Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar**

Çok yaygın:	Kuvvetsizlik/yorgunluk, ürperti
Yaygın olmayan:	Işığa karşı duyarlı olma durumu (fotosensitivite reaksiyonu)
Çok seyrek:	Ani aşırı duyarlılık (anafilaksi)

### **Duyu Organları**

Yaygın:	Gözde uyum bozukluğu, göz bebeği genişlemesi (midriazis), görme bozuklukları
Yaygın olmayan:	Değişmiş tad duyusu, kulak çınlaması
Çok seyrek:	Göz içi basıncının arttığı bazı durumlar (dar açılı glokom)

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşılırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. EFEXOR XR'ın saklanması**

*EFEXOR XR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFEXOR XR'ı kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Wyeth İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad., Maya Akar Center, No.: 100-102, Kat:9, 34394 Esentepe/İstanbul

**Üretici:** Wyeth Medica Ireland

Little Connel, Newbridge, County Kildare, İrlanda.

*Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.*  
25.03.2009